This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`


UNIV ENT
Digitized by Google

HN 796 .L

Digitized by Google

K.N. 926

Digitized by Google

Digitized by Google

Praktisch-gemeinnützige

Naturgeschichte

der

Vögel

des

In- und Auslandes

von

H. G. L. Reichenbach.

Kupfersammlung,

erster Theil mit 408 Abbildungen der

Schwimmvögel,

nämlich für die Gattung:

Aptenodytes: Pinguin	11	Abbild.	Larus: Möve	31	Abbild.
Alca: Alk	16	—	Lestris: Raubmöve	13	—
Uria: Lumme	18	—	Procellaria: Sturmvögel	13	—
Colymbus: Spitztaucher	13	—	Diomedea: Albetros	6	—
Podiceps: Lappentaucher	30	—	Phaeton: Tropikvogel	3	—
Mergus: Sägetaucher	11	—	Plotus: Anfinga	4	—
Anas: Ente	132	—	Sula: Tölpel	6	—
Anser: Gänse	27	—	Halieus: Kormoran	10	—
Cygnus: Schwäne	12	—	Tachypetes: Fregatvogel	4	—
Rhynchops: Scheerenschnäbler	6	—	Pelecanus: Pelekan	10	—
Sterna: Seeschwalbe	30	—			

Leipzig.

Verlag der Wagner'schen Buchhandlung.

1836.

Digitized by Google

Die naturgetreuen Abbildungen sind das erste und dringendste Bedürfniß für die Naturgeschichte. Ohne sie bleiben selbst die besten Beschreibungen mancher Mißdeutung ausgesetzt, und es sind vorzugsweise die Kupferstiche, welche dem Texte einen bleibenden Werth verleihen. Sie sind es, welche dergleichen Werke zu Portraitsammlungen der Natur erheben, zu Archiven, aus denen nicht nur die Liebhaber der Naturgeschichte sich zweckmäßig belehren können, sondern welche auch die geprüften Naturforscher selbst nachschlagen müssen.

Lesson.

Guß und Druck
von
Friedrich Nies in Leipzig.

Digitized by Google

Das Thierreich.

Zweiter Band.

Vögel. I. Schwimmvögel.

1. 2. Der gefleckte Pinguin. Aptenodytes (Spheniscus) demersa L. *Le manchot tacheté.*
Tab. I. Kopf, Fuß, Flügelfeder. Südsee, besonders um Südafrika.

3. Der Halsband-Pinguin. Aptenod. (Sphen.) torquata Lath. *Manchot à collier.*
Neu-Guinea, Neu-Georgien, Kerguelen.

4. 5. Der kleine Pinguin. Apten. (Catarractes) minor Lath. *Petit Manchot.*
Neu Seeland.

6. Der rothbraune Pinguin. Apten. Catarractes (Catarr. brunnea). Forst. *Le Gorfou.*
Nach Temminck der junge Vogel folgender Art. Südmeer.

7. Der Schopf-Pinguin. Apten. (Catarr.) chrysocoma Gm. *Le Gorfou sauteur, manchot sauteur, le Macaroni.*
Neuholland, Maluinen.

8. Der Papua-Pinguin. Apten. (Catarr.) papua Gm. *Manchot papou.*
Neu-Guinea, Falklands-Inseln, Papus.

9—11. Der Riesen-Pinguin. Apten. patagonia Gm. *Grand manchot, le grand Gorfou.*
11. Nestvogel aus der Schwägrichenschen Sammlung in Leipzig. Tab. I. Kopf mit Zunge.
Südmeer, Maluinen, Falklands-Inseln, Neuholland.

12—13. Der Brillen-Alk. Alca impennis L. *Le grand pingouin, ping. brachyptère.*
Ein Pärchen. Im Eismeere.

14—16. Der Tord-Alk. Alca Torda L. *Le pingouin commun, ping. macroptère.*
Ein Pärchen nebst Nestvogel. — Tab. I. Schnabel, Fuß. Im arctischen Ocean.

17. Der Zwerg-Alk. Alca (Phaleris) psittacula Pall. *Le starique psittacule, le starique perroquet.*
Südsee.

18. Der geschopfte Zwerg-Alk. Alca (Phal.) tetracula Pall. *Le starique tetracule.*
Soll der junge Vogel voriger Art seyn? Eigne Art nach Lichst. — Tab. I. Schnabel.
Südsee.

19. 20. Der Federbusch-Zwerg-Alk. Alca (Phal.) cristatella Pall. *Le starique cristatelle.*
19. ist der junge Vogel: Alca pygmaea Gm.? Tab. I. Schnabel.
Japan, bis zur Behringsstraße.

21. 22. Der geschopfte Papagei-Alk. Alca (Mormon) cirrhata Lath. *Macareux à aigrette.*
22. jüngrer Vogel. Meer um Kamtschatka und Nordamerika

Digitized by Google

23. 24. Der eigentliche Papagei-Alk, Larventaucher. Alca (Mormon) Arctica Gm. *Macareux moine.*
Tab. I. Kopf, Fuß. Nordküsten von Europa und Amerika.

25. Der gehörnte Papagei-Alk. Alca (Mormon) corniculata. *Macareux cornu.*
Küsten des nördl. stillen Oceans, vornehmlich die entlegnen Inseln.

26—30. Die Troil-Lumme, das große Taucherhuhn. Uria Troile Brünn. *Guillemot à gros bec.*
28. Wintervogel. 29. Nestvogel. 30. rothbraune Varität. Tab. I. 27. 30. Schnabel.
In den arctischen Meeren beider Continente.

31—33. Die weißringige Lumme. Uria Hringvia Brünn. *Guillemot lacrymant.*
32. Wintervogel. 33. jung. — Tab. I. 31. 32. Schnabel, Fuß. Im arctischen Ocean.

34. Die langgeschnabelte Lumme. Uria lomvia Brünn. *Guillemot à long bec.*
Tab. I. Schnabel. Im arctischen Ocean.

35. Die Mandtische Lumme. Uria (Grylle) Mandtii Lichtst. *Guillemot Mandt.*
Tab. I. Schnabel. Im arctischen Ocean.

36—40. Die Gryll-Lumme. Uria Grylle L. Grylle speculigera. *Guillemot grylle ou à miroir blanc.*
37. 39 und 40. Wintervögel: U. marmorata Lath. Tab. I. Schnabel, Fuß.
Im arctischen Ocean.

41—43. Die Krabben-Lumme. Uria (Mergulus) Alle Temm. *Le petit Guillemot ou Guill. nain.*
42. jung. 43. Wintervogel. — Tab. I. Kopf, Fuß. Im arctischen Ocean.

44—48. Der rothkehlige Spitztaucher. Colymbus septentrionalis Lath. *Plongeon Cat-marin.*
48. jung: Col. stollatus Gm. 47. C. striatus Gm. Nördliches Europa.

49—52. Der Polar-Spitztaucher. Colymbus arcticus L. *Plongeon Lumme, le Lumme.*
51. 52. jung: C. ignotus Bchst. Nördliches Europa.

53—56. Der Eis-Spitztaucher. Colymbus glacialis L. *Plongeon imbrim.*
55. 56. jung: Col. Immer. Gm. Nördliches Europa.

57—63. Der Hauben-Lappentaucher. Podiceps cristatus Lath. *Grèbe huppé.*
60. 61. Nestvögel. 62. 63. halbjähriger Vogel. Europa.

64—67. Der rothhalsige oder graukehlige Lappentaucher. Podiceps rubricollis Lath. *Grèbe sous-gris ou à joues grises.*
65. 66. Nestvögel. 67. einjähriger Vogel. Europa.

68. 69. Der gehörnte Lappentaucher. Podiceps cornutus Lath. *Grèbe cornu.*
69. jung: Col. obscurus Gm. Europa.

Digitized by Google

70. 71. Der arctiſche Lappentaucher. Podiceps arcticus **Faber.** *Grève arctique.*
71. Weibchen. Island, Norwegen.

72. 73. Der geöhrte Lappentaucher. Podiceps auritus **Lath.** *Grèbe oreillard.*
Europa, im öſtl., ſelten im mittl. Deutſchland.

74. 75. Der Louiſiana-Lappentaucher. Podiceps ludovicianus **Lath.** *Grèbe de la Louisiane.*
Luiſiana.

76. 77. Der Carolina-Lappentaucher. Podiceps carolinensis **Lath.** *Grèbe cerclé ou à bec cerclé.*
Nordamerika.

78. Der Domingo-Lappentaucher. Podiceps dominicus **Lath.** *Grèbe de St. Domingue.*
St. Domingo, Braſilien.

79—84. Der kleine Lappentaucher. Podiceps minor **Lath.** *Grèbe castagneux.*
81. Neſtvogel. 83. 84. junges Männchen. Im Norden beider Continente.

85—87. Der Nonnen-Sägetaucher. Mergus albellus L. *Harle Piette.*
87. Weibchen. Norden beider Continente.

88. Der Kronen-Sägetaucher. Mergus cucullatus **Lath.** *Harle couronné.*
Nordamerika.

89—92. Der langgeſchnabelte Sägetaucher, Meerrachen. Mergus serrator L. *Harle huppé.*
89. altes Männchen. 90. Weibchen. 91. Neſtvogel. 92. junges Männchen.
Norden beider Continente.

93—95. Der Gänſe-Sägetaucher. Mergus merganser L. *Grand harle.*
95. junges Weibchen. Norden beider Continente.

96—100. Die Schellenente. Anas clangula L. *Le garrot, canard garrot, C. de Hongrie.*
97. u. 100 Weibchen. 98. junges Männchen: **A. glaucion. L. Gm.**
Norden beider Continente.

101. Die Epaulet-Schellenente. Anas scapularis **Brhm.** et **Mehl.** *Le garrot aux épaulettes.*
Island: See Myvatn.

102. 103. Die ſchmalgeſchnabelte Schellenente. Anas angustirostris **Brhm.** *Le garrot à bec étroit.*
Braunſchweig, Thüringen.

104. 105. Die dickköpfige Schellenente. Anas albeola L. *Le garrot ou le petit canard à grosse tête ou C. bucéphale.*
Nordamerika.

Digitized by Google

106—111. Die Kragenente. Anas histrionica L. *Canard à collier, Can. arlequin.*
108. Weibchen. 109. 110. Nestvögel. 111. junges Männchen.
Norden beider Continente.

112—115. Die Eisente. Anas glacialis L. *Canard de Miclou.*
112. junges. 115. altes Weibchen. 113. junges. 114. altes Männchen.
Norden beider Continente.

116—118. Die Kolbenente. Anas rufina PALL. *Canard siffleur huppé.*
116. Weibchen. Nordeuropa.

119—123. Die Schopf- oder Reiherente. Anas Fuligula L. *Canard morillon.*
120. Varietät. 122. Herbst-Weibchen. Norden beider Continente.

124—126. Die Tafelente. Anas ferina L. *Canard Milouin.*
Im Norden beider Continente.

127. Die Valisnerien-Ente. Anas Valisneriana WILS. *Canard de Valisnerie.*
Nordamerika.

128. 129. Die weißäugige Moorente. Anas Nyraca GM. *Canard à iris blanc.*
128. Weibchen. Ost- und Nordeuropa.

130—132. Die Bergente. Anas marila L. *Canard Milouinar.*
131. Weibchen. Norden beider Continente.

133. 134. Die rothschimmernde Ente. Anas rubida (us) WILS. *Canard rougeatre changeant.*
A. cyanirostris LICHTST. aus Mexico. Am Delaware in Nordamerika.

135. 136. Die weißköpfige Ente. Anas leucocephala LATH. *Canard à tête blanche.*
Nordeuropa.

137—139. Die braune Moorente. Anas fusca L. *Canard double Macreuse.*
137. Männchen im Spätherbst. 138. Weibchen im Spätherbst. 139. jung. Männchen.
Norden beider Continente.

140—144. Die schwarze Moorente. Anas nigra L. *Canard Macreuse.*
140. 142. Männch. und 144. Weibch. im November. 141. 143. Männch. im Frühling.
Norden beider Continente.

145. Die amerikanische Brillenente. Anas perspicillata L. GM. *Macreuse à large bec* BUFF. *à lunettes, grande Macr. de la Baye de Hudson* BRISS.
Nordküsten von Amerika: Nootka Sund.

146. Die Lappenente. Anas lobata SHAW. *Canard caronculé.*
Neuholland.

147—150. Der Königs-Eider. Anas spectabilis L. GM. *Canard à tête grise* BUFF.
147. 148. Männch. 149. Weibch. 150. M. jung. Norden beider Continente.

Digitized by Google

151—158. Die Eiderente, Eidergans. Anas mollissima L. *L'oie à duvet, l'Eider, Canard Eider.*

151. 152. Männchen. 153. 154. Weibchen. 155. 156. Nestvogel. 157. Abart: Somateria norvegica Brehm. 158. dieſe jung. Norden beider Continente.

159. Die Sichelente. Anas falcaria Gm. L. *Canard aux ailes en faucille.*

Weibchen aus Kamtſchatka. China, Kamtſchatka.

160. 161. Die Labrador-Ente. Anas labradoria Lath. *Canard de Labrador.*

Männchen und Weibchen. Nordamerika.

162—164. Die Schnatterente. Anas strepera L. *Canard chipeau.*

162 und 164. Männchen und Weibchen aus Europa. 163. amerikan. Männchen. Europa und Nordamerika.

165. Die amerikaniſche Schnatterente. Anas americana Gm. L. *Le Canard d'Amerique, canard Jensen.*

Nordamerika.

166. Die rothſeitige Schnatterente. Anas pyrrhoplagia Pöpp. *Canard à flancs rouges.*

Chili.

167. Die mexicaniſche Schnatterente. Anas icariotis Lchtst.

Mexico.

168—170. Die Pfeifente. Anas penelope L. *Le siffleur.*

Vorzüglich im nördlichen Europa.

171. Die Bogenente. Anas arcuata Horsf. *Canard arqué.*

Java.

172—173. Die rothgelbe Ente. Anas rutila Pall. (Anas kasarka Gm.)

Orient, Oſteuropa.

174. Die Herbſtente. Anas autumnalis L. *Canard siffleur à bec rouge.*

Südamerika.

175. Die dunkle Ente. Anas obscura Gm. L. *Canard obscur.*

Nordamerika.

176—177. Die Mondente. Anas discors L. *Canard Sarcelle de Cayenne ou Soucrourou.*

176. Männchen. 177. Weibchen. Mexico, Cayenne.

178. Die Blauſchulterente. Anas coerulata Lath. *Canard Sarcelle à epaulettes bleues.*

Mexico.

179. Die Paturi-Ente. Anas Paturi Spix. *Canard Patouri.*

Braſilien.

180. Die Wittwenente. Anas viduata L. *Canard à petit bec.*

Südamerika.

Digitized by Google

181. Die Schnabelfleckente. Anas maculirostris Lichtst. *Canard Sarcelle à bec tacheté.*

Montevideo.

182. Die Weißkehlente. Anas bahamensis L. *Canard Sarcelle de Bahama.*

Bahamische Inseln, Brasilien.

183—185. Die Knäkente. Anas querquedula L. *La Sarcelle ordinaire* ou *Canard Sarcelle d'été.*

185. Weibchen. Europa.

186—187. Die Kriekente. Anas crecca L. *La Sarcelle d'hiver.*

187. Weibchen.

188—189. Die amerikanische Kriekente. Anas carolinensis Gm L. *La Sarcelle d'hiver d'Amerique.*

Nordamerika.

190—193. Die Brautente. Anas sponsa L. *Le Canard de Caroline.*

192. Weibchen. 193. junger Vogel.
Von Florida bis zum See Otario in den vereinigten Staaten.

194—195. Die Mandarinente. Anas galericulata L. *Canard Sarcelle de la Chine.*

China.

196. Die Nelkenente. Anas caryophyllacea Lath. *Canard à tête couleur de canelle.*

Ostindien.

232. Die türkische Ente, wild. Anas moschata L. *Canard musqué.*

Brasilien.

197. 198. Die türkische Ente, zahme Varietät. Anas moschata L. var. domestica. *Canard musqué domestique.*

Gezähmt.

233. Bastard der türkischen und Stockente. Anas moschata ♂ boschas.

199—202. Die Stockente. Anas boschas L. *Canard ordinaire.*

201. Weibchen. 202. Nestvogel. Europa und Nordamerika.

203—204. Die Schillerente. Anas boschas corruscans. *Canard changeant.*

An der Elbe und am Rhein.

205—212. Die zahme Ente. Anas boschas domestica. *Canard ordinaire domestique.*

213—214. Die Krummschnabelente. Anas adunca L. *Canard à bec courbé.*

Holland.

215—217. Die Löffelente. Anas clypeata L. *Canard Souchet.*

216. junges Männchen. 217. Weibchen. Norden von Europa und Amerika.

Digitized by Google

218—219. Die Spießente. Anas acuta L. *Canard à longue queue.*
219. Weibchen. Norden von Europa und Amerika.

220. Die Spitzschwanzente. Anas oxyura Lichtst. *Canard à queue aigue.*
Südamerika.

221—223. Die Brandente. Anas Tadorna L. *Canard Tadorne* ou *Canard Renard.*
222. Weibchen. 223. jung. Nord- und Westeuropa.

224—226. Die Schneeente. Anas hyperborea L. Gm. *L'oie hyperborée.*
225. Weibchen. 226. jung. Männchen. Norden von Europa und Amerika.

227. Die Höckerschnabelgans. Anas melanotos Gm. L. *L'oie bronzée à crête sur le bec.*
Ostindien.

228. Die Bernakelgans. Anas bernicla L. *Oie cravant.*
Norden von Europa und Amerika.

229. Die weißwangige Gans. Anas leucopsis Bchst. (erythropus Gm. L.) *Oie Bernache.*
Nordeuropa.

230. Die Rothhalsgans. Anas ruficollis Pall. (torquata Gm. L.) *Oie à cou roux.*
Nordasien und Nordeuropa.

231. Die Brillenente. Anas perspicillata L.
Bessre Abbildung als 145, nach einem erst später erhaltenen schönen Exemplare.

232. Die wilde türkische Ente.
Erklärung siehe nach No. 196.

233. Bastard aus der türkischen und Stockente.
Erklärung siehe nach No. 198.

234—235. Die Mähnengans. Anser jubatus Spix. *Oie à crinière.*
Brasilien.

236—237. Die ägyptische Gans. Anser aegyptiacus (L.) *Oie d'Egypte.*
Nordafrika.

238—239. Die Weißstirngans. Anser albifrons Bchst. *Oie rieuse.*
Norden von Europa und Amerika.

240—241. Die Saatgans. Anser segetum Meyer. *Oie des moissons.*
Nordeuropa.

242—243. Die Graugans. Anser cinereus Meyer. *Oie cendrée, sauvage.*
Nordeuropa.

Digitized by Google

244—245 b. Die zahme Gans. Anser ciner. domesticus. *Oie domestique.*

246. Der Spornschwan, Gambiagans. Cygnus gambensis (L.) *Cygne de Gambie.*

Afrika, Gambia.

247—248. Der Cravattenschwan. Cygnus canadensis (L.) *Cygne à cravatte.*

Canada.

249—250. Der schwarze Schwan. Cygnus plutonius (Shaw, Anas atrata Lath.) *Cygne noir.*

Neuholland.

251. Der Gänseschwan, Schwanengans. Cygnus guineensis (Anas cygnoides L.) *Cygne de Guinée.*

Guinea.

252. Der Schwarzhalsschwan. Cygnus nigricollis (Lath. et Anas melanocephala Molin. Gm. L.) *Cygne à tête et cou noire.*

Im südlichsten Amerika.

253. Der Singschwan. Cygnus ferus Briss. *Cygne sauvage ou à bec jaune.*

Norden von Europa und Amerika.

254. Der Stummschwan. Cygnus Olor Illg. *Cygne à bec rouge ou domestique.*

Europa.

255. Der Wachsschnabel. Cereopsis Novae Hollandiae Lath. *Céréopse de la Nouvelle Hollande.*

Neuholland.

256. Der schwarze Scheerenschnabel. Rhynchops nigra L. *Bec en ciseaux noir.*

Antillen.

257. Der graulichе Scheerenschnabel. Rhynchops cinerascens Spix. *Bec en ciseaux cendré.*

Amazonenfluß.

258. Der kurzschnäbelige Scheerenschnabel. Rhynchops brevirostris Spix. *Bec en ciseaux court-bec.*

Junger des Vorigen? Amazonenfluß.

259. Großschnabelige Seeschwalbe. Sterna magnirostris Lichtst. *Sterne à grand bec, Hatis à tête noire Azar.*

St. Francisco in Brasilien.

260. Die kaspische Seeschwalbe. Sterna caspia Gm. *Sterne caspienne.*

Kaspisches Meer, Ostsee.

261. Die engländische Seeschwalbe. Sterna anglica Montagu. *Sterne Hansel.*

Norden von Europa und Amerika.

Digitized by Google

262. Die kentiſche Seeſchwalbe. Sterna cantiaca Albin. *Sterne de Kent.*

England. Nordeuropa.

263. Die Bergiſche Seeſchwalbe. Sterna Bergii Lichtst. *Sterne Berg.*

Vorgebirge d. g. Hoffnung.

264. Die cayenniſche Seeſchwalbe. Sterna cayennensis Gm. L. *Sterne de Cayenne.*

Cayenne.

265. Die ſchnelle Seeſchwalbe. Sterna velox Rüpp. Crtzschm. *Sterne rapide.*

Vom rothen Meere bis Cap.

266. Die ähnliche Seeſchwalbe. Sterna affinis Rüpp. Crtzschm. *Sterne voiçine.*

Ebenſo.

267. Die Silber-Seeſchwalbe. Sterna argentata Br. *Sterne argenté.*

Oſtſee.

268—271. Die gemeine Seeſchwalbe. Sterna hirundo L. *Sterne, hirondelle de mer, Pierre-Garin.*

Europa u. Nordamerika.

272—275. Die arctiſche Seeſchwalbe. Sterna arctica Temm. *Sterne arctique.*

Im höchſten Norden von Europa u. Amerika.

276. Die ſchwarzbäuchige Seeſchwalbe. Sterna melanogastra Tem. *Sterne à ventre noir.*

Oſtindien, Ceylon, Java.

277. Die ſchwarznackige Seeſchwalbe. Sterna melanauchen Temm. *Sterne à nuque noire.*

Molukken, Küſten von Celebes.

278—281. Die kleine Seeſchwalbe. Sterna minuta L. *Petite Sterne ou hirondelle de mer.*

Europa u. Nordamerika.

282. Die Schnurrbart-Meerſchwalbe. Sterna leucopareija Natt. *Sterne Monstac.*

Südeuropa (Ungarn, Trieſt).

283. Die weißflügelige Meerſchwalbe. Sterna leucoptera Temm. *Sterne leucoptère.*

Am adriatiſchen und mittelländiſchen Meere.

284. 285. Die ſchwarze Seeſchwalbe. Sterna nigra L. *Sterne epouvantail.*

Norden u. Oſten von Europa, Nordamerika.

286. Die Inca-Seeſchwalbe. Sterna Inca Less. et Garn. *Sterne des Incas.*

Küſten von Peru, vorzügl. Inſel St. Lorenzo.

Digitized by Google

287. Die Noddi-Seeschwalee. Sterna stolida Lath. *Le Noddi, oiseau fou.*
Cayenne, Tropenküsten bis Südsee, stilles Meer, Neuholland.

288. Die dünnschnabelige Seeschwalbe. Sterna tennirostris Temm. *Sterne à bec grêle.*
Westküste von Afrika, Senegal.

289. 290. Die kleine Möve. Larus minutus L. *Mouette pygmée.*
290. jung. Europa.

291. Die schwarzschnabelige Möve. Larus melanorhynchos Temm. *Mouette à bec noir.*
Chili.

292. 293. Die braunmaskirte Möve. Larus capistratus Temm. *Mouette à masque bonn.*
Im hohen Norden.

294. Die Kapuzenmöve. Larus cucullatus Lchtst. *Mouette à capuchon.*
Mexico,

295. Die weißäugige Möve. Larus leucophthalmos Lchtst. *Mouette à iris blanc.*
Am rothen Meer.

296. Die Huthmöve. Larus pileatus Br. *Mouette à chapeau.*
Dänische Inseln.

297. 298. Die Lachmöve. Larus ridibundus L. *Mouette rieuse.*
Europa.

299. 300. Die schwarzköpfige Möve. Larus atricilla L. *Mouette à tête noire, à capuchon plombé.*
Nord- u. Südamerika.

301—303. Die dreizehige Möve. Larus tridactylus Lath. *Mouette à trois doigts.*
303. jung. Nprden von Europa.

304. Die Elfenbeinmöve. Larus eburneus L. *Mouette blanche.*
Im höchsten Norden von Europa u. Amerika.

305. 306. Die nordische Sturmmöve. Larus canus L. *Mouette à pieds bleus.*
Nordeuropa.

307. 308. Die Heringsmöve. Larus fuscus L. *Mouette à pieds jaunes.*
Norden von Europa, Ostsee.

309. Audouins Möve. Larus Audouinii Payr. *Mouette d'Audouin.*
Sardinien, Corsika.

310. 311. Die weißschwingige Möve. Larus leucopterus Fabr. *Mouette leucoptère.*
311. jung. Grönland, Island.

Digitized by Google

312. 313. Die Silbermöve. Larus argentatus Lath. *Mouette à manteau argenté.*
313. jung. Nordeuropa.

314. 315. Die Bürgermeiſtermöve. Larus glaucus L. *Mouette Bourguemestre, Goëland.*
315. jung. Nordeuropa.

316. Die ſchwarzgeſchwänzte Möve. Larus melanurus Temm. *Mouette ou Goëland à queue noire.*
Japan, Corea.

317. 318. Die Schwarzmantelmöve. Larus marinus L. *Mouette ou Goëland à manteau noir.*
Nordeuropa.

319—323. Die Schmarotzer-Raubmöve. Lestris parasitica Boj. *Le Labbe à longue queue.*
320 u. 323. jung. Nordeuropa.

324. Büffons Raubmöve. Lestris Buffonii Boj. *Le Labbe Buffon.*
Grönland.

325. Benicke's Raubmöve. Lestris Benickii Br. *Le Labbe Benicke.*
Farör u. benachb. Inſeln, Nordeuropa.

326. 327. Die Felſenraubmöve. Lestris crepidata Br.
Junge Vögel von L. parasitica?, am Elbufer gefangen.

328. Die breitſchwänzige Raubmöve. Lestris pomarina Temm. *Stecoraire pomarin.*
Norwegen, Island.

329—331. Die Rieſenraubmöve. Lestris catarractes Illg. *Stercoraire cataracte.*
Island, Hebriden, Farder Inſeln.

332. Der Rieſenſturmvogel. Procellaria gigantea Lath. *Pétrel géant.*
Südmeer.

333. 334. Der Eisſturmvogel. Procellaria glacialis L. *Pétrel Fulmar.*
Eismeer.

335. Der Harlik. Procellaria hasita Forst. *Pétrel harlic.*
Südſee.

336. Der Cap-Sturmvogel. Procellaria capensis Lath. *Pétrel Damier.*
Südafrika.

337. Berard's Sturmvogel. Procellaria Berardi Quoy. et Gaim. *Pétrel Berard.*
Malouinen.

338. 339. Der kleine Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) pelagica L. *Pétrel de tempète.*
Ocean.

Digitized by Google

340. (vgl. 388.) Wilson's Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) Wilsonii Bonap. *Pétrel de Wilson.*
Nördlicher Ocean.

341. Sturmvogel Englands. Procellaria (Puffinus) Anglorum Temm. *Pétrel de Manks.*
Ocean.

342. Der bläuliche Sturmvogel. Procellaria (Pachyptila) vittata Gm. L. *Pétrel bleu.*
Südl. Breite 58°.

343. Der Taucher-Sturmvogel. Procellaria (Halodroma) Urinatrix Gm. *Puffinus de Gornot.*
Küsten von Peru.

344. 345. Der Riesen-Albatros. Diomedea exulans L. *L'albatros commun, le mouton de Cap.*
345. junger Vogel. Um Südafrika.

346. Der Augenbraunen-Albatros. Diomedea melanophrys Temm. *Albatros à sourcils noirs.*
Südafrika.

347. Der Grünschnabel-Albatros. Diomedea chlorochynchos Lath. *Albatros chlorochynque.*
Südmeer.

348. Der Ruß-Albatros. Diomedea fuliginosa Temm. *Albatros fuligineux.*
Südmeer.

349. Der rothschwänzige Tropikvogel. Phaëton phoenicurus Gm. L. *Paille en queue ou phaéton à brins rouges.*
Ostindische Meere.

350. 351. Der weißschwänzige Tropikvogel. Phaëton aethereus Gm. L. *Paille en queue ou phaéton à brins blanches.*
351. junger Vogel. Atlantischer Ocean, Südmeer.

352. 353. Le Vaillants Anhinga. Plotus Le Vaillantii Temm. *Anhinga Le Vaillant.*
353. junger Vogel. Senegal, Vorgeb. d. g. H. und ein Theil von Afrens Küsten.

354. 355. Der schwarze Anhinga. Plotus Anhinga L. *Anhinga noir.*
355. Weibchen. Im tropischen und nördlichen Amerika.

356—358. Der weiße Tölpel. Sula Bassana Briss. *Fou de Bassan.*
Farder Inseln, Orkaden, Hebriden bes. die Insel Baß.

359. Der schwarze Tölpel. Sula fusca Briss. *Fou noiratre.*
Antillen.

360. Der brasilianische Tölpel. Sula brasiliensis Spix. *Fou de Brésil.*
Auf den Inseln bei der Stadt Rio de Janeiro.

361. Der kleine Tölpel. Sula parva Gm. Cus. *Petit Fou.*
Cayenne.

362—364. Der große Kormoran Halieus Carbo Illig. *Le Cormoran.*
362. Männch. 363. Weibch. 364. junges Männchen. Im hohen Norden, von da an den Küsten d. Nord- u. Ostsee, einzeln bis Mitteldeutschland.

Digitized by Google

365. Der gehäubte Kormoran. Halieus cristatus Olafs. (graculus Mey. Temm.) *Le Cormoran huppé, C. largup.*
Im hohen Norden, Island, Farder Inseln, Orkaden u. Hebriden, einzeln bis Brunsbüttel gekommen.

366. Der büschelösrige Kormoran Vieillots. Halieus naevius Lath. L. (punctatus Lath. Hydrocorax dilophus Vicill.) *Cormoran dilophe Vicill.*
Neuseeland.

367. Der büschelöhrige Kormoran Cüviers. H. bilophus Cuv. bei Guerin. *Cormoran oreillé.*
Im hohen Norden.

368. 369. Der brasilianische Kormoran. H. brasilianus (Carbo bras.) Spix. *Cormoran du Brésil.*
In Brasilien, im See Coari.

370. Gaimards Kormoran. H. Gaimardi Garnot et Cess. *Cormoran Gaimard.*
Küsten von Peru, bei Callao und auf den Felsen um die Insel St. Lorenzo.

371. Der Zwerg-Kormoran. H. pygmaeus Pall. *Cormoran pygmé.*
Am kaspischen Meere, Küsten von Osteuropa, Ungarn, auf der Donau.

372. 373. Der braunköpfige Fregatvogel. Tachypeter Aquilus Illig. *La Frégate.*
Männchen u. Weibchen. An d. Küsten v. Amerika, im Atlantischen u. stillen Ocean.

374. 375. Der weißköpfige Fregatvogel. Tachypeter leucocephalus (Pelec.) Buff. *La Frégate à tête blanche.*
Alt u. jünger. Dasselbe Vaterland, unser Expl. 374. von den Küsten Neuhollands.

376. 377. Der Schopf-Pelikan, Kropfgans. Pelecanus Onocrotalus Linn. *La Pélican blanc ou rose.*
377 junger Vogel: Philippensis Briss. Ostküsten von Europa, Asien u. Afrika.

378. 379. Der frisirte Pelikan. Pelecanus crispus Feldegg. *La Pélican frisé.*
Küste von Dalmatien.

380. 381. Der Brillen-Pelican. Pelecanus perspicillatus Temm. *Le Pélican à lunettes.*
Küsten Australiens.

382. 383. Der schwarzbraune Pelikan. Pelecanus fuscus Vicill. *Le Pélican brun.*
382 ist Büstons, 383 Cuviers Vogel. Amerika, auf den Strömen, auf den Antillen, im Südmeere.

384—386. Der röthliche Pelikan. Pelecanus rufescens Lath. *Le Pélican rougeate.*
384. 385. unser Vogel (Weibchen?) 386. Rüppels Vogel. Afrika.

387. Die Adlermöve. Larus ichthyaetor Pall. *La Mouette aigle des poissons.*
Im Ganges, dem rothen u. kaspischen Meere.

Digitized by Google

343. Garnot's Sturmvogel. Procellaria (Halodroma) Urinatrix Illg. *Le Puffinure de Gàrnot (Puffinuria Garnotii Lesson.)*
Supplement zu Taf. 27. Küsten von Peru.

388. Wilsons Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) Wilsonii Bonap. *Pétrel Wilson.*
Nordamerika.

389. Leach's Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) Leachii Temm. *Pétrel Leach.*
St. Kilda.

390. Der schönwangige Lappentaucher. Podiceps Kallipareus Less. Garnot. *Grèbe à joues belles, à calotte noire Less. Petit plongeon à lunettes Pernetty.*
Pod. occipitalis Lesson, Malouinen.

391. Rolland's Lappentaucher. Podiceps Rollandi Quoy et Gaimard. *Grève Rolland.*
Malouinen.

392. 393. Der Spornschwan, Gambiagans. Cygnus gambensis (L.) *Cygne de Gambie.*
Supplem. zu Abb. 246. Männchen u. Weibchen. Afrika. Gambia.

394. Die Kurzflügelente. Anas brachyptera Lath. *Canard à ailes courtes.*
Malouinen.

395. Die Radjah-Ente. Anas Radjah Less. *Canard Radjah.*
A. leucomelas Garnot. Buru.

396. Die dunkle Brandente. Anas tadornoides Will. Jard. *Canard Tadornoide.*

397. Die antarktische Gans. Anser antarcticus (Anas) Lath. *Oie antarctique.*
Malouinen.

398. 399. Die Weißstirngans. Anser albifrons Bchst. *Oie rieuse.*
Junge Vögel bei Schandau in Sachsen geschossen, zu 238. 239. Norden von Europa und Amerika.

400. 401. Der schwarze Scheerenschnabel. Nachträge zu 256.

402. Der orientalische Scheerenschnabel. Rhynchops orientalis Ruepp. *Becen ciseaux de l'Orient.*
Rh. albirostris Lichtst. Am Nil.

403. Der Papageiartige Regenalk. Ombria psittacula Eschsch. (Zu 17.)

404. Der gehörnte Winteralk. Chimerina cornuta Eschsch. *Chimerine cornue.*
Insel St. Paul, im kamtschatkischen Meere.

405. Der kurzschwänzige Albatros. Diomedea brachyura Temm. *Albatros courte-queue ou trapu.*
Ga-ran-tsjoo der Japaner. Ostküste von Japan, um die Liou-Kiou Inseln nach Süden hin.

406. Die Bergente aus Neuholland. (zu 130.) Weibchen.

407. 408. Die scheckbrüstige Schopf-Ente. Anas poecilothorax Rchb. *Canard morillon à poitrine tachetée.*
Männchen und Weibchen. Neu-Holland.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google